Ergebnisse eines Europäischen Forschungsprojektes zu Agroforstwirtschaft: AGROMIX

<https://agromixproject.eu/>

F. Herzog¹, D. Antichi⁹, L. Batsakrzian¹¹, P. Burgess⁴, C. den Hond Vaccaro¹, C. Dupraz¹¹, J.M. Eden⁷, M. Edo², S. Eldris⁵, M. Entling², M. Giannitsopoulos⁴, J. Goracci¹⁰, M. Gosme¹¹, A. Graves⁴, K. Jarosch¹, F. Lavado³, I. Lecomte¹¹, A. Mantino⁹, M. Mele⁹, R. Olave⁵, J. Palma⁶, A. Ripamonti⁹, V. Rolo³, S. Schnabel³, J. Smith⁶, W. Smith⁸, C. Tosh⁸, L.G. Tramacere⁹, U. Schmutz⁷

Traditionelle Agroforstsysteme: 8.8% der LN in Europa

Von traditionellen zu modernen Agroforstsystemen

- Traditionelle AFS: Zahlungen für Biodiversität und Landschaft
- Moderne AFS:
 - Ebenfalls Biodiversität und Landschaft *und*
 - CO₂-Speicherung → Klimaschutz
 - Klimaresilienz → Anpassung
 - Attraktiv für LandwirtInnen
 - Mechanische Bewirtschaftung
 - Produktiv & wirtschaftlich

Mit Agroforst das Land doppelt nutzen

Eine Mehrfachnutzung der Fläche mit Bäumen und weiteren Kulturen diene der Umwelt, hiess es an einer Online-Tagung. Immer mehr Bauern interessieren sich für solche modernen Systeme.

Von Josef Scherer
Publiziert am Mittwoch, 12. Mai 2021 18:06
Lesedauer 4 Minuten

Artikel teilen
f

Agroforst: Apfelbäume mit einer Fruchtfolge von Weizen, Erdbeeren, Gründüngung und Buntbrache. (Bild Beat Felder, BBZN)

Messen

—
Biodiversität

Tierwohl und -produktivität

Horizon-2020 **Agromix**: Fallstudien und Europäische Perspektive

AgroForestry “Core sites”

Langfrist-Experimente, 20+ Jahre
Wiederholungen und Vergleichsparzellen
Ermöglichen statistische Auswertungen

Unsere Herangehensweise:

Messungen: Biodiversität, Tierwohl, Produktivität

Computermodule: Klima- und Bewirtschaftungsszenarien

Skalierung: Was können wir für Europa lernen?

Artenvielfalt Vögel: Agroforst > Monokultur

- Daten von 8 Standorten (CH: Sursee, Möhlin)
- 48 Arten insgesamt
- 305 “Messpunkte” (Audiomoth)
- Agroforst (n=19), Wald (n=15), Obstgärten (n=8), Monokultur: Acker/Weide (n=18)
- **Signifikante Unterschiede der Artenzahlen (Indikator für Artenvielfalt)**

Fledermausaktivität: Am höchsten in silvopastoralen Agroforstsystemen

- Daten von 8 Standorten (CH: Sursee, Möhlin)
- 10 Arten insgesamt
- 305 “Messpunkte” (Audiomoth)
- Silvoarabel (n=7), Silvopastoral (n=13) Wald (n=16), Obstgärten (n=9), Acker (n=9), Weide (n=13). Echolokation (Minuten mit Rufsignalen)
- **Signifikante Aktivitätsunterschiede. Silvopastoral > Wald**

CH: Sursee, Möhlin

Tierwohl & -produktivität

Temperature-
humidity index
(THI):
Lufttemperatur
x Feuchte →
Hitzestress

THI Juni 21-22

THI Juli 21-22

THI August 21-22

UK (Loughgall)

- Offene Weide
- Agroforst
- Hitzestress-Grenzwert

FR (Lamartine)

- Offene Weide
- Agroforst (Hecke)
- Agroforst (60 Bäume/ha)
- Hitzestress-Grenzwert

IT (Tenuta di Paganico)

- Offene Weide
- Agroforst
- Hitzestress-Grenzwert

Fleischzuwachs und Tierwohl: Offene Weide im Frühling, Agroforst im Sommer

Tägliche
Gewichtszunahme

Tenuta di Paganico (Italy)
Stiere und Rinder

— Offene Weide
— Agroforst

Cortison
Stress Levels

In den Experimenten in Italien und Frankreich führte der Hitzestress während des Sommer zu **signifikanten Unterschieden der Haar- cortisol Konzentration** (Index für Hitzestress).
Der Hitzestress beeinflusste den **Zuwachs an Lebendgewicht** und das **Fressverhalten**.

Silvo-arable AFS

Mit Messwerten (Klima, Agroforstsysteme, Kontrollparzellen) Computermodelle "eichen" >> Virtuelle Experimente durchführen

Zwei Modelle, welche die Interaktionen zwischen Bäumen und Kulturen simulieren können:

Messwerte <> Modelle → Parametrisieren → Szenarien und "virtuelle Experimente"

Yield-SAFE (van der Werf et al., 2007)												Hi-sAFE (Dupraz et al., 2021)																													
RCP4.5						RCP6						RCP8.5						RCP4.5						RCP6						RCP8.5											
Year	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CO ₂ eq	Scenario	Yield	Stress	Yield	Stress	Yield	Stress	Year	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CO ₂ eq	Scenario	Yield	Stress	Yield	Stress	Year	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CO ₂ eq	Scenario	Yield	Stress	Yield	Stress										
2000	35.0	0.5	0.0	35.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2000	35.0	0.5	0.0	35.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2000	35.0	0.5	0.0	35.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
2050	65.0	1.0	0.1	66.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2050	65.0	1.0	0.1	66.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2050	65.0	1.0	0.1	66.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
2100	100.0	1.5	0.2	101.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2100	100.0	1.5	0.2	101.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2100	100.0	1.5	0.2	101.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Yield-SAFE (van der Werf et al., 2007)

Hi-sAFE (Dupraz et al., 2021)

Loughghall (Nord-Irland, UK):

Silvoarables System (est. 1999)

Pappeln (142 trees/ha), Gerste

Permanent Grassland	Agroforestry - Silvopastoral trees	Woodland
Pasture with perennial ryegrass (<i>Lolium perenne</i> L.)	Silvopastoral system planted with ash trees (400 stems ha ⁻¹)	Woodland planted with ash trees (2500 stems ha ⁻¹)

AFBI

Yield-SAFE Klimaszenario RCP 8.5: Weniger Bäume wären besser?

Hoch ← ————— Baumdichte ————— → Tief

Szenarien		Baumdichte (ha ⁻¹)													
		142							50						
	Zeitraum	Gerste Monokultur	Pappel Monokultur	Silvoarabelle Gerste	Silvoarable Pappel	LER (Gerste)	LER (Holz)	LER (Gerste+Holz)	Gerste Monokultur	Pappel Monokultur	Silvoarabelle Gerste	Silvoarable Pappel	LER (Gerste)	LER (Holz)	LER (Gerste+Holz)
		mono		AFS					mono		AFS				
Baseline	1999-2039	6.2	429	2.4	297	0.39	0.69	1.08	6.2	429	4.5	157	0.72	0.37	1.09
RCP 8.5	2020-2060	6.4	460	2.4	314	0.38	0.68	1.06	6.4	460	4.6	164	0.72	0.36	1.08
	2060-2100	7.0	462	3.3	323	0.47	0.70	1.17	7.0	462	6.2	178	0.89	0.39	1.27

- Silvoarabel (Pappel, Gerste)
- Zwei volle Umtriebe (Pappel: 40 Jahre)
- CO2 "Düngungseffekt": Generelle Ertragszunahme
- 50 Bäume/ha sind ausreichend

Aber: Klimaextreme?

Wakelyns

England, UK

Biobetrieb

23 Hektaren
Agroforst, Pflanzung
in 2001

Silvoarabel

44 Walnussbäume/ha

Fruchtfolge: 6 Jahre
Getreide –
Kunstwiese - Linsen

Hi-sAFe RCP8.5: Walnuss & Weizen Wachstumsphasen ergänzen sich, Bäume schützen Kulturen wenn Klimawandel stärker wird

- Weizenertrag ist höher in Monokultur in der ersten Hälfte des Jahrhunderts the first half of the century wenn der Klimawandel noch weniger stark ist
- Nach 2068 steigt der Ertrag im Agroforssystem durchgehend an, obwohl die Bäume dann grosser sind, aber der Klimawandel wird stärker
- Agroforst scheint die Kultur gegen Ertragsausfall zu schützen in Jahren mit besonders ungünstiger Witterung (2044)
- Kein signifikanter Unterschied in den jährlichen Ertragsunterschieden zwischen Monokultur und Agroforst
- Walnuss treibt das Laub spät aus (Mai). So können sich die Kulturen ohne Beschattung entwickeln bzw. die Beschattung tritt erst später im Jahr auf, wenn Hitze und Trockenheit am intensivsten sind

Hi-sAFe RCP8.5: Agroforst erhöht Erbsenertrag bereits jetzt und noch stärker in Zukunft

- Der **Erbsenertrag** wird durch Agroforstwirtschaft bereits jetzt verbessert und bis 2100 sogar noch mehr
- Dieser Nutzen von Agroforst nimmt, mit wenigen Ausnahmen, **rotz zunehmender Grösse der Bäume mit stärkerem Klimawandel** zu

Upscale

—
Was können wir für den
Europäischen Kontinent lernen?

Wo braucht es Agroforst ganz besonders?

- Regionen mit Mehrfachbelastungen (z.B. Erosion, Stickstoffüberschuss, tiefe Biodiversität, hoher Einfluss des Klimawandels erwartet, etc.)
- Wenn Agroforst auf 10% dieser «Zielregionen» eingeführt würde, könnten bis zu 43% der Europäischen Klimagasemissionen kompensiert werden.

Analyse für die Schweiz:
Interaktive Karte
[Klimaschutz dank Agroforstwirtschaft](#)

Wo ist die Einführung von AFS erfolgsversprechend?

- «High profile» Regionen:
 - Gut ausgebildete Bauern und Bäuerinnen
 - Hoher Anteil an Biolandbau
- Dort gibt es mehr Bäuerinnen und Bauern, die fähig und empfänglich sind für die Einführung von Agroforst

Schlussfolgerungen

- 1) Agroforstwirtschaft (silvopastoral) verbessert das Mikroklima und den Tierschutz (Hitzestress) und damit die Tierproduktion erheblich.
- 2) Agroforstsysteme (silvo-arabel) können die Ernteerträge im Klimawandel stabilisieren. Bäume können in schwierigen Jahren „die Ernte schützen“.
- 3) Wählen Sie sorgfältig die richtige Kombination aus Bäumen und Feldfrüchten aus.
- 4) Baumdichte: Selbst 50 Bäume/ha können „ausreichen“, um Auswirkungen auf die LER zu erzielen (z. B. LER 1,27 für Gerste in Irland)
- 5) Agroforstsysteme sind **keine** Extensivierungsmaßnahme; sie erhalten die Produktivität und bieten gleichzeitig weitere Umweltleistungen
- 6) Nicht alle Mechanismen sind vollständig verstanden oder werden in dieser Forschung umfassend behandelt
- 7) Weit verbreitete Unsicherheit darüber, wie die Agroforstwirtschaft von einer Nischen- zu einer Mainstream-Technologie werden kann

Partnership

REVOLVE